

## 4. Regresija II

Strojno učenje 1, UNIZG FER, ak. god. 2021./2022.

Jan Šnajder, vježbe, v1.8

### 1 Zadatci za učenje

1. [Svrha: Shvatiti kako se nelinearna funkcija u ulaznom prostoru funkcija preslikava u linearnu funkciju odnosno (hiper)ravninu u prostoru značajki.]

- (a) Regresijom želimo aproksimirati funkciju jedne varijable  $y = 3 \cdot (x - 2)^2 + 1$ . Skicirajte graf te funkcije. Definirajte linearan model  $h(x)$  uz funkciju preslikavanja  $\phi(x) = (1, x, x^2)$ . Odredite vektor težina  $\mathbf{w} = (w_0, w_1, w_2)$  tog modela.
- (b) Skicirajte u prostoru  $(x_1, x_2)$  (dakle u prostoru značajki) izokonture funkcije  $y$ . Naznačite u tom prostoru točke u koje se preslikavaju primjeri  $x^{(1)} = 1$ ,  $x^{(2)} = 2$  i  $x^{(3)} = 3$ . Koja je vrijednost od  $h(x)$  za navedene primjere?

2. [Svrha: Razumjeti matricno rješenje za L2-regulariziranu regresiju. Razumjeti kako regularizacija popravlja lošu kondiciju matrice.]

- (a) Izvedite u matricnom obliku rješenje za vektor  $\mathbf{w}$  za hrbatnu (L2-regulariziranu) regresiju.
- (b) Raspoložemo sljedećim skupom primjera za učenje:

$$\mathcal{D} = \{(x^{(i)}, y^{(i)})\}_{i=1}^4 = \{(0, 4), (1, 1), (2, 2), (4, 5)\}.$$

Podatke želimo modelirati polinomijalnom regresijskom funkcijom  $h(x) = w_0 + w_1x + w_2x^2$ . Napišite kako bi u ovome konkretnom slučaju izgleda jednadžba iz zadatka (a), ako se koristi regularizacijski faktor  $\lambda = 10$ . (Ne morate ju izračunavati, samo ju napišite da se vide konkretni brojevi.)

- (c) Komentirajte na koji način L2-regularizacija rješava problem numeričke nestabilnosti rješenja za  $\mathbf{w}$ .
- (d) Koristimo regresiju za predviđanje cijene nekretnine na temelju površine, starosti i udaljenosti od glavne prometnice. Koliko primjera nam je minimalno potrebno a da bi rješenje bilo izračunljivo jednadžbom iz (a), ako pritom ne koristimo preslikavanje. Koliko primjera nam je potrebno ako koristimo preslikavanja s polinomom drugog stupnja i interakcijskim značajkama? Što bi se dogodilo da kao značajku dodamo godinu izgradnje nekretnine? Obrazložite.
3. [Svrha: Isprobati izračun regresijskog modela s različitim funkcijama preslikavanja i razviti intuiciju kako o tome kako funkcija preslikavanja određuje složenost hipoteze u ulaznome prostoru.] Linearnim modelom univarijatne regresije želimo aproksimirati jednu periodu funkcije  $f(x) = \sin(\pi x)$ . Raspoložemo skupom primjera za učenje

$$\mathcal{D} = \{(0.25, 0.707), (0.5, 1), (1, 0), (1.5, -1), (2, 0)\}.$$

- (a) Izračunajte parametre linearnog modela regresije u izvornom prostoru primjera, tj. s funkcijom preslikavanja definiranom kao  $\phi(x) = (1, x)$ . Skicirajte dobivenu regresijsku funkciju.
- (b) Izračunajte parametre modela jednostruke polinomijalne regresije drugog stupnja, tj. modela koji koristi funkciju preslikavanja  $\phi(x) = (1, x, x^2)$ . Skicirajte dobivenu regresijsku funkciju.

- (c) Izračunajte parametre modela višestruke polinomijalne regresije četvrtog stupnja, tj. modela koji koristi funkciju preslikavanja  $\phi(x) = (1, x, x^2, x^3, x^4)$ , uz L2-regularizaciju ( $\lambda = 1$ ). Skicirajte dobivenu regresijsku funkciju.
- (d) Koji je model u ovom slučaju najprikladniji? Zašto?

*Napomena:* Izračun možete načiniti u nekom alatu koji podržava izračun matricnih operacija. Skicu također možete načiniti u nekom alatu, ili je možete napraviti ručno, izračunom vrijednosti regresijske funkcije u nekoliko odabranih točaka.

4. [*Svrha: Razumjeti vezu između faktora regularizacije i složenosti modela.*] Neka  $\mathcal{H}_{d,\lambda}$  označava model polinomijalne regresije stupnja  $d$  s L2-regularizacijskim faktorom  $\lambda$ . Razmatramo četiri modela:  $\mathcal{H}_{2,0}$ ,  $\mathcal{H}_{5,0}$ ,  $\mathcal{H}_{5,100}$ ,  $\mathcal{H}_{5,1000}$  u ulaznome prostoru  $\mathcal{X} = \mathbb{R}$ . Pretpostavimo da su podaci u stvarnosti generirani funkcijom koja je polinom trećeg stupnja ( $d = 3$ ). Pretpostavite da imamo razmjerno malo podataka i da je šum u podacima razmjerno velik. Na dva odvojena crteža skicirajte
- (a) regresijsku funkciju  $h(x)$  za sva četiri modela te
- (b) pogrešku učenja i ispitnu pogrešku za sva četiri modela.
5. [*Svrha: Shvatiti kako regularizacija utječe na optimizaciju. Shvatiti geometrijski argument zašto L1-regularizacija rezultira rijetkim modelima, a L2-regularizacije ne.*]
- (a) Objasnite koja je svrha regularizacije i na kojoj se pretpostavci temelji.
- (b) Koja je prednost regulariziranog modela u odnosu na neregularizirani? Dolazi li ta prednost više do izražaja u slučajevima kada imamo puno primjera za učenje ili kada ih imamo malo?
- (c) Razmatramo višestruku regresiju,  $h(\mathbf{x}; \mathbf{w}) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2$ . Skicirajte izokonture neregularizirane funkcije pogreške u ravni  $\mathbb{R}^2$  koju definiraju parametri  $w_1$  i  $w_2$  (napomena: funkcija pogreške je konveksna). Zatim skicirajte izokonture regularizacijskog izraza definiranih L2-normom vektora težina (i ova je funkcija konveksna). Pomoću ove skice objasnite na koji način regularizacija utječe na izbor optimalnih parametara ( $w_1^*$ ,  $w_2^*$ ). Skicirajte krivulju mogućih rješenja za  $\lambda \in [0, \infty)$ .
- (d) Ponovite prethodnu skicu, ali ovog puta sa L1-regularizacijom. Na temelju ove skice pokušajte odgovoriti na pitanje zašto L1-regularizacija daje rjeđe modele od L2-regularizacije.
6. [*Svrha: Shvatiti vezu između težine značajki, važnosti značajki i složenosti modela.*] Treniramo model regresije uz nelinearnu funkciju preslikavanja  $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ , gdje  $m > n$ , uz L2-regularizaciju.
- (a) Kako biste odredili optimalan regularizacijski faktor  $\lambda$ ?
- (b) Kako, nakon treniranja modela, možemo provjeriti (1) koje su značajke nebitne i (2) je li izvorni (neregularizirani) model presložen?
- (c) Kako bi se u ovom slučaju ponašao L1-regularizirani model?
- (d) Pretpostavite da u podacima postoji skup multikolinearnih značajki koje su, osim što su redundantne, također i irelevantne, odnosno zavisna varijabla u stvarnosti uopće ne ovisi o tim varijablama. Ako model nije regulariziran, koje su očekivane težine tih značajki?

## 2 Zadatci s ispita

1. (T) Kao regularizacijski faktor kod modela linearne regresije tipično se koristi neka p-norma vektora težina,  $\|\mathbf{w}\|_p$ . **Na kojoj se činjenici temelji korištenje norme kao regularizacijskog izraza?**
- A Ako je model prenaučeni, hipoteza će imati velike magnitude težina
- B Ako je model optimalne složenosti, hipoteza će imati male magnitude težina
- C Ako su težine hipoteze velike magnitude, model je prenaučeni
- D Ako su težine hipoteze male magnitude, model je podnaučeni

2. (T)  $L_1$ -regularizacija ili LASSO kao regularizacijski izraz koristi prvu normu vektora težina,  $\|\mathbf{w}\|_1$ . **Što je prednost a što nedostatak  $L_1$ -regularizacije?**

- A Prednost je da zadržava sve značajke u modelu, a nedostatak je da Gramova matrica može biti blizu singularne ako u podacima postoji multikolinearnost
- B Prednost je da  $L_1$ -regulariziranu pogrešku možemo minimizirati gradijentnim spustom, a nedostatak je da rezultira rijetkim modelima
- C Prednost je da postoji rješenje u zatvorenoj formi (pseudoinverz), a nedostatak da izračun  $L_1$ -regulariziranog pseudoinverza ovisi o broju značajki ali i o broju primjera
- D Prednost je da izbacuje značajke iz modela, a nedostatak je da  $L_1$ -regularizirana pogreška nema minimizator u zatvorenoj formi

3. (N) Raspolažemo sljedećim skupom primjera u dvodimenzionom ulaznom prostoru:

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})\} = \{((1, 0), 1), ((2, -3), 2), ((3, 5), -1), ((5, 0), -4)\}$$

Na ovom skupu gradijentnim spustom trenirali smo  $L_1$ -regularizirani model linearne regresije sa  $\lambda = 1$ . Dobili smo težine  $\mathbf{w} = (2.12, -0.94, -0.08)$ . **Koliko iznosi  $L_1$ -regularizirana pogreška  $E(\mathbf{w}|\mathcal{D})$ ?**

- A 7.10    B 2.69    C 1.58    D 0.29

4. (T) Svaki algoritam strojnog učenja ima neku induktivnu pristranost. Induktivna pristranost sastoji se od pristranosti jezika i pristranosti preferencije. **Koja je razlika između induktivnih pristranosti regularizirane i neregularizirane linearne regresije?**

- A Oba algoritma imaju isti model, definiran kao linearnu kombinaciju značajki i težina, pa dakle imaju istu pristranost jezika, ali se razlikuju u pristranosti preferencije jer imaju različito definiranu empirijsku pogrešku (osim ako je regularizacijski faktor jednak nuli)
- B Algoritmi imaju različite pristranosti, i to različitu pristranost preferencije jer regularizirana regresija preferira jednostavnije hipoteze, a onda i različitu pristranost jezika jer je model neregularizirane regresije nadskup modela regularizirane regresije
- C Za razliku od neregularizirane regresije, regularizirana regresija preferira jednostavnije hipoteze, međutim pristranosti su im identične jer su oba algoritma definirana kao linearna kombinacija značajki i težina te oba koriste identičan optimizacijski postupak (pseudoinverz matrice dizajna)
- D Algoritmi se ne razlikuju po pristranosti preferencijom budući da koriste istu funkciju gubitka (kvadratni gubitak), međutim regularizirana regresija ima jaču induktivnu pristranost jezika od regularizirane regresije budući da prvi model uključuje drugi model

5. (P) Raspolažemo skupom označenih primjera  $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$  koji su u stvarnosti generirani funkcijom koja je polinom trećeg stupnja. Podataka imamo razmjerno malo, a šum u podacima je velik. Skup  $\mathcal{D}$  dijelimo na skup za učenje i skup za ispitivanje. Neka je  $\mathcal{H}_{d,\lambda}$  familija modela polinomijalne regresije stupnja  $d$  s  $L_2$ -regularizacijskim faktorom  $\lambda$ . Na skupu za učenje postupkom najmanjih kvadrata treniramo četiri modela iz te familije:  $\mathcal{H}_{2,0}$ ,  $\mathcal{H}_{5,0}$ ,  $\mathcal{H}_{5,100}$  i  $\mathcal{H}_{5,1000}$ . Zatim izračunavamo empirijsku pogrešku (očekivanje kvadratnog gubitka) ovih modela na skupu za ispitivanje. **Što možemo zaključiti o ponašanju hipoteza naučenih iz ovih modela na skupu primjera  $\mathcal{D}$ ?**

- A Najbolje će generalizirati hipoteza iz  $\mathcal{H}_{5,100}$  ili hipoteza iz  $\mathcal{H}_{5,1000}$ , ovisno o količini šuma u podacima
- B Hipoteza iz  $\mathcal{H}_{2,0}$  imati će veću pogrešku na skupu za učenje od hipoteze  $\mathcal{H}_{5,0}$ , ali mogu podjednako loše generalizirati
- C Hipoteza iz  $\mathcal{H}_{5,1000}$  će generalizirati bolje od hipoteze iz  $\mathcal{H}_{5,0}$ , ali će imati veću pogrešku na skupu za učenje
- D Hipoteza iz  $\mathcal{H}_{5,100}$  će bolje generalizirati od hipoteze iz  $\mathcal{H}_{2,0}$  i imat će manju pogrešku na skupu za učenje

6. (T) Rješenje najmanjih kvadrata s L2-regularizacijom (hrbatna regresija) je:

$$\mathbf{w} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$$

gdje  $\lambda \mathbf{I} = \text{diag}(0, \lambda, \dots, \lambda)$ . **Koji je efekt regularizacije na Gramovu matricu?**

- A Dodavanje vrijednosti  $\lambda$  na dijagonale Gramove matrice povećava normu težina  $\|\mathbf{w}\|$
- B Minimizacija norme težina  $\|\mathbf{w}\|$  povećava multikolinearnost Gramove matrice i smanjuje složenost modela
- C Minimizacija norme težina  $\|\mathbf{w}\|$  čini Gramovu matricu kvadratnom i singularnom
- D Dodavanje vrijednosti  $\lambda$  na dijagonale Gramove matrice povećava njezin rang
7. (P) Koristimo regresiju za predviđanje uspjeha na studiju. Kao značajke možemo koristiti ocjene u četiri razreda srednje škole (značajke  $x_1$ – $x_4$ ), prosjek ocjena sva četiri razreda ( $x_5$ ) te uspjeh iz matematike ( $x_6$ ) i fizike ( $x_7$ ) na državnoj maturi (ukupno 7 značajki). Ne moramo iskoristiti sve značajke, ali ih želimo iskoristiti što više. Za preslikavanje u prostor značajki koristimo preslikavanje s kvadratnim, interakcijskim i linearnim značajkama. Od interakcijskih značajki uzimamo samo interakcije parova značajki (npr.  $x_1x_2$ ) i interakcije trojki (npr.  $x_1x_2x_3$ ) između svih značajki koje koristimo. **Koliko minimalno primjera za učenje trebamo imati, a da bi rješenje bilo stabilno i bez regularizacije?**
- A 75    B 38    C 48    D 63